

Dem Schmallenberg-Virus richtig vorbeugen

In ihrer aktiven Zeit zwischen April und November können Gnitzen das Schmallenberg-Virus übertragen. Wie Sie die Symptome erkennen und was es zu beachten gilt, lesen Sie im Steckbrief der AGES.



Gnitzen oder Bartmpcken, regional auch Gnitten, sind eine Familie kleiner, zumeist blutsaugender Mpcken in der Ordnung der Zweiflpgler. Weltweit leben etwa 4000 Arten dieser Tiergruppe, pber 190 Arten sind in Østerreich bekannt. So klein, so gefæhrlich knnen sie den Tieren werden. Denn in ihrer aktiven Zeit zwischen April und November knnen sie den Schmallenberg-Virus pbertragen. Dieser wurde im Jahr 2011 erstmals in Deutschland nachgewiesen. In den folgenden Jahren traten weitere Fælle in Deutschland und Nachbarlændern auf. Nachdem seit 2016 weniger Fælle auftraten, ist weiterhin mit

periodischen Neuausbrüchen zu rechnen.

Das Virus tritt bei Rindern sowie Schafen, Ziegen und anderen Wiederkäuern auf. Überträger sind saugende Stechmücken (hauptsächlich Gnitzen). Während bestimmter Trächtigkeitsstadien kann das Virus auch den Fetus infizieren und löst dann unter anderem Missbildungen, Aborte und Nervenschädigungen aus. Um das Risiko einer Infektion zu vermindern, sollten Wiedertierhalter ihre Tiere vor Gnitzen schützen. Auch ein zeitlich angepasster Besamungszeitpunkt verhindert die Infektion des Fetus. Es gibt zugelassene Impfstoffe.

Hier finden Sie eine ausführliche Zusammenfassung.

Besuchen Sie uns auf: fleischundco.at